

68. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

68TH GEOLOGICAL CONGRESS OF TURKEY

6-10 Nisan/April 2015
MTA Kültür Sitesi

TOPLUM VE DOĞA İÇİN
SU
Water for Nature & Society

BİLDİRİ ÖZLERİ KİTABI
ABSTRACTS BOOK

Editör/Editor
Kaan SAYIT



TMMOB
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
CHAMBER OF GEOLOGICAL ENGINEERS OF TURKEY

KB ANADOLU, ÇAMDAĞ BÖLGESİ, DEVONİYEN YAŞLI DEMİR TAŞLARININ KARBONAT PLATFORMU ÜZERİNDE OLUŞUMALARININ PALEOİKİLMSEL ANALİZİ (ÜST LOHKOVİYEN VE ORTA JİVESİYEN)

İsmail Ömer Yılmaz^a, M. Cemal Göncüoğlu^a, Dilek Gülnur Saydam Demiray^b,
İbrahim Gedik^b

^aJeoloji Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye

^bMaden Tektik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Ankara, Türkiye
(ioyilmaz@metu.edu.tr)

ÖZ

Bu çalışmada, Çamdağ bölgesi, KB Anadolu'da Alt-Orta Devonyen yaşlı demirli fasiyes içeren 2 detaylı stratigrafik kesit ölçülmüştür.

Kabalakdere'de Fındıklı Formasyonu'nun üst kısmında, demirtaşları istiftabanında kırmızı ve yeşil çamurtaşları ile kumtaşlarının ardalanması ile başlar ve yukarı doğru dolomittaşı, oolitli demirtaşları içeren dolomitik kireçtaşı ve şamositli çamurtaşları istifleri ile devam eder. Bu karbonatlardan elde edilen konodontlar Lohkoviyen'in delta-pesaviszonu'nu göstermektedir.

Ferizli Formasyonu Fındıklı Formasyonu'nu tabanda kuvarz arenit fasiyesi ile uyumsuzlukla örter. Fromasyon kırmızı renkli demirce zengin biyoklastik ve oolitik tane taşı fasiyeleri içeren kireçtaşları ve dolomitik kireçtaşları fasiyelerini içermektedir. Bu istifteki dolomitik kireçtaşları orta Jivesiyen'a ait ensensis ve hemiansatus zonlarını içerir. Karbonatlar baskın olarak götüşmiş ve şamositleşmiş fosil parçaları ve şamositik ootillerden oluşmaktadır. Oolittaları demir içeren karbonatlar/demirtaşlarından oluşmakta olup mikritleşmiş/demirleşmiş brakiyopot ve ekinit biyoklastları da içermektedirler. Götit, kahverengi demir-silikatlar, şamosit, kuvarz taneleri ve brakiyopotlar matriks içerisinde veya ayrı taneler olarak gözlenmiştir. Demir peloitler daha çok tanetaşı fasiyeleri içerisinde gözlenmiştir. Biyoklastik tanetaşı/biyosparit fasiyesi içerisinde mikro delgileri dolduran kısmi çökelim, veya ekinit dikenli boşlukları boyunca çökelim şeklinde demir birikimleri SEM görüntülerinde tespit edilmiştir.

Demir çökelimi yükselen PH ve oksitleyen koşullara sahip ıslak/tropik iklim şartları altında karasal ortamlardan çözülmüş veya taşınmış çökelim şeklinde veya denizel ortamlarda şelflerin üstüne uzanan yükselen akıntılar tarafından taşınan çözünmüş demirin oksitlenme şartlarında çökelimi şeklinde açıklanabilir.

Birincil demirin denizel karbonat ortamlarında devirsel çökelimi ve geniş alanlara dağılımı demirce zengin kireçtaşları ve çamurtaşlarının kontrol mekanizmasının Orta Jivesiyen'de iklim, deniz seviyesi değişimi ve okyanusal değişimlerin işbirliği ile ilişkili olabileceğini göstermektedir. Üst Lohkoviyen'de de çökelimi kontrol eden benzer veya aynı faktörler olmuştur. Orta Jivesiyen ve geç Lohkoviyen arasında dikkate alınır bir sıcaklık farkı bulunmasına rağmen, sedimentolojik veriler bu ciddi farklılığı en azından bu bölgede desteklememektedir.

Anahtar kelimeler: Üst Lohkoviyen-Orta Jivesiyen, KB Türkiye, sedimentoloji, demirtaşları, paleoiklim

PALEOCLIMATIC ANALYSIS OF THE FORMATION OF DEVONIAN (UPPER LOCHKOVIAN AND MIDDLE GIVETIAN) IRONSTONES ON THE CARBONATE PLATFORM, NW ANATOLIA, ÇAMDAĞ REGION

**İsmail Ömer Yılmaz^a, M. Cemal Göncüoğlu^a, Dilek Gülnur Saydam-Demiray^b,
İbrahim Gedik^b**

^aDepartment of Geological Engineering, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

^bGeneral Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA) of Turkey, Ankara, Turkey
(ioyilmaz@metu.edu.tr)

ABSTRACT

2 iron-bearing stratigraphic successions have been measured in detail within the Lower-middle Devonian in the Çamdağ region, NW Anatolia.

The upper part of the Fındıklı Formation in Kabalakdere including ironstones are characterized by alternating red and green mudstones and sandstones at the bottom, followed by a series of dolomite, dolomitic limestone with oolitic ironstones, and chamositic mudstones at the top. Conodonts from these carbonates indicate the delta–pesavis zones of the late Lochkovian.

The Ferizli Formation unconformably overlies the Fındıklı Formation with a quartz-arenite succession at the bottom. The formation includes an alternation of red, iron-rich limestones composed of bioclastic and oolitic grainstones and dolomitic limestones. The dolomitic limestones in this succession mark the ensensis and hemiansatus zones of the middle Givetian age. The carbonates are dominated by goethitized and chamositized fossil fragments and chamositicooolites. The oolites are composed of iron-bearing carbonates/iron, the bioclast of micritized/ironized brachiopods, and crinoids. Goethite, brown iron-silicates, chamosite, quartz clasts, and brachiopods are primarily recognized as a part of the matrix or as separate grains. Iron peloids are observed mostly in grainstone facies. Within the bioclasticgrainstone/biosparitefacies, partial iron precipitation infilling themicroborings or precipitation along the spine holes on echinoid grains have been recognized in SEM images.

Iron precipitation could be explained as precipitation of transported and dissolved iron from a terrestrial environment under wet/subtropical climate conditions within oxidizing and increased pH circumstances, or as dissolved iron transported by upwelling currents over the shelves and precipitated under an oxidizing environment. The cyclic occurrence of primary iron in a marine carbonate environment and its extensive distribution over large areas indicates that a controlling mechanism for iron-rich carbonates and mudstones could be related to the cooperation of climate, sea level, and oceanographic changes in the middle Givetian. During the late Lochkovian, the same or very similar controlling factors might have operated. Although there is a considerable paleotemperature difference between the middle Givetian and the late Lochkovian, sedimentological data does not support this difference at least at this region.

Keywords: Upper Lochkovian-Middle Givetian, NW Turkey, sedimentology, ironstones, paleoclimate